

Resumé

Ou Gastropode

4 Types

2 Sous-types

γαστήρ	νεύρον	notoneures	}
νωτός	νεύρον	gastroneures	
πλευρά	νεύρον	pleuroneures	
		στυλινεures	}
	στυλινεures	νεύρον	

στυλινεures
 στυλινεures - νεύρον
 en prenant les variations
 du Centre asymétrique

από νεύρον του νωτός -

στυλινεures - νεύρον
 avec Mer

Boule




32^m
1867

2^o Fractionnement. ici est le point
le plus important de l'histoire ou développement
de cysalopsode.



Le fractionnement n'est que partiel.

Un mâle par œuf qui se forme
Cultivé dans la formation successive de
cellules qui viennent se diviser toujours
en deux et constituent une tête de
mâle de nature cellulaire. Ce qui est
appelé la tête femelle. ici ce




37.

32^{m.}
1867




A. CHARLES & SONS
ARCHITECTS
15, NASSAU ST. N.Y.




32⁴
1867

Côté du dos




Côté abdominal



Un dans cette position par le côté droit, il gausai un rapprochement a faire avec le autre mollusq
 le pied est antero-supérieur
 le manteau est dorsal.
 la bouche supérieur

laisser le tronc en la

Côté abdominal



opposer cette figure a celle B
 feuille 29.

63

32 m
1867

opposer cette figure
à celle A pag 38

