

1/ Agassiz Le = 25. mai
1867

Gastrella haliotidea

ventre
forme figure.

animal fœtus par dexte
pour montrer, de
position de viscères
et
de la poche ou
voute respiratoire.

Muscle de l'appareil
d'equal.

poche latérale vers le côté
respiratoire transverse.

partie gauche et inférieure de
la poche respiratoire. dans
laquelle se trouve le
cœur. avec ses vaisseaux.

la poche de la main par
se par l'air et faire le
cœur de la main cardiaque.

Pied. fœtus jusqu'à la base
et du côté médian.

Cavité pulmonaire
qui ne se creuse
pas de sang
et vasculaire.

Cœur de la base qui du côté
droit ou gauche
commence par la partie
droite partiel de
trachée, qui
représente le vaisseau
ou membrane de la

laissant de l'expansion
grande, qui
indiquent de
la trachée/pneum.

implantant la poutre.
partie fœtale du
l'appareil de la trachée.

Bois inférieur ou la partie supérieure
du bonnet après l'air de la poche respiratoire.

Leur est plus et le bonnet droit qui se prolonge vers le bas de la trachée
supérieure de la trachée. comme de voir ici

Remarque que le dessin est fait d'un animal

entraîné ce qui rend la position de visceribus un peu différente de ce qu'elle est
en réalité.

Nota - V. S.


surpassant cette figure j'ignorais un embarras. Vu par dessus le tube
digestif ne devait pas être à droite puisqu'il porte sur le dos et est à droite. Mais
mais voici ce qui arrive j'ai fondé entre le tube digestif (anus) et le côté
droit. Ce qui a rapporté ce tube digestif à gauche. (villants) à droite on
l'observait. = mais si cette disposition du tube digestif semble bien être
régulière on n'a que le rapport au Cœur au pectus et de vaisseaux
respiratoires pour voir que le Lumbus A en effet lève à gauche
et entraîne le Rectum. et l'anus.

Paris le 26. mai 1867

C. Halictidea.

Dors
partie postérieure du Corps.
ouverte par suite de la
position des viscères.

(Bonne figure
coloration.)



Nota. - Il est peu d'importance que les viscères puissent paraître
variables autant dans les contractions.

Suivant les parties droites, toutes et tout à gauche.

et les organes semblent se placer ainsi : l'estomac est au dessus de l'intestin
et les autres viscéraux sont placés à gauche de l'estomac.

Paris le 2 Juin 1867.

G. halotidea

Très bonne figure.

avant par but de
Mouth.

la distribution zonal
à la coupe phytologique.

entre l'alvair et gâtique gauche
elle embrasse dans un cercle le poignet
et muet. extrait de la
langue.

colore pallido gauche.
 (già) quasi Ca. Note qui ha
 rapporto alle an. Dattur

arter. cystolique -

avec les autres gens.

à l'origine de l'artère cyphalique
 dans l'artère générale
 ou les matric. H.

qui reunite le canal entre la
partie pluviale et la
partie liti.

et qui fournit un artenda
qui p^uut en delivre - et qui
va a l'interieur de la cache
par la voie. (nota) voir. n° 66a

Lapartie descendante de l'arbre.

funder. Eine große Anzahl gibt
 vier hundert ~~hundert~~ ^{hundert} Pfund
 jährlich zu veran-
 schlagen.

De brachse mit vom lin
Detektivat alle am pind

= Cette branche le G. f. et avoir
un ram. en avant un ram.

Leuzen,

cit mae

A-

artere genital
tergine
quell

Na
an
lymphi

Salivari inf droite
Cunum avec -

der linken Prof. . anterior
ist ein rechte in Höhe
et a. roth.

Es hat sich erhalten
an meine d. h. Kypse von
et dänisch mit. in
d. ich habe den einzigen
politischen Mann
bisher kennen
gelernt.

Je trouve 3 autres hépatites
autres. ou lypémi.

Sei 1^{er} le plus hyperm. donne
au kobe hyper. (a)

elle finiraient aussi à la fin l'espérance
du 2^e lobe. ou tout le bifurc


(6.) fuit au 2^e lobule. *ph*
/ pour alveolar hyp. de 3^e. et
a l'angle 3^e et 4^e.

*La page finie par Pastur
L'écriture - est Ce bel.*

Le dernier hépatique finit en
branchant à l'estime à la
1^{re} portion de l'intestin.

arter. hepaticus inferior et
Genital. profunde

Ce tiers qui ne peut
croquer d'un, en traversant
l'ensemble génital à celui-ci
passé, de la figure et passé
aux deux moitiés de cette
partie inférieure où se
fait le partage de ces deux lobes et ainsi
pour les autres parties de la
reproduction, pour celles qui
sont en la base cartilagineuse.



Gestacella Heliotida.

Respiration.



Cestauella *Heliotidea*

Exterieur.



Cellule.

Hauter —


Difficile à bien comprendre.

à cause 1^{re} de contraction

2^{de} de replis multiples.

Mal décrit - on n'en a pas décrit.

Pour le dessin. le prendre. — Au fond du sillon dorsal droit.



Deux lignes faisant un angle.

Une concentrique à l'autre.

L'excentrique — est lamellaire, embrasse le pédicule du corps.
— j'ai appelé (a)

L'intercentrique — est un boudoir
saillant qui — cubane le bord
de la capsule.



C'est elle qu'on voit quand
l'animal a la capsule

Je l'ai marquée (b.)

(a) ou le réfléchissant après avoir fait le tour. Vient en dedans de (b.) (a)

Le but de
contraction ou de
relâchement
ou linéaire, fait
un repère
apparaître

(ou a^4/b^4) — il est en fait en une seule ligne qui
continue en faisant un angle 1^{er} avec b^3/b^2
quel ligne.

2^o avec le bord de la cellule
supérieur très petit
testicule.

P
L'infirmité aura-remplacé et est (a^2) et (b^1).

Betta collaris
halistictica

Cete 1



*La tête quand
elle avance.*



6. Halobelia:

Acte

not.





To. Halobates



a. m. m. pour
montr. l'infundibule
et la fosse

Bonne coupe
à redonne
qu'on voit le levier
après l'organe.



