

Pennatula grisea



Pennatula

Scenatules = (du n° 1 au n°

a
c



7
permatula fortica.
spinosa du Reg. animal

La colle le 20 juillet 86



Voici un des festons d'un
 barbu. Vu par la cote anterieur.

Il me paraît n'y avoir
 qu'un seul point pour
 chaque animal.

Le calice n'est pas
 difficile à voir. et
 me paraît
 peut-être
 formé par les

Le b. a
 Cependant a
 vuoir le j. a
 d'autre exemple.

Cette figure montre
 comment les
 Reg. animal est
 formé. et le barbu
 qu'il n'y a qu'un animal
 entre les chaum. des esp.
 au fond de chaque feston.
 Le feston n'est qu'un
 G. a. g. au fond de G. b. g. de
 l'autre

Il me paraît
 pour les points de la colle
 une matière blanche qui est toute
 grande et qui n'a pas de couleur.
 avec la colle
 = Trois points de colle en tout
 par: deux points de colle en
 la colle.

Le animal n'est pas
 de la colle
 de la colle est en tout
 pour la colle et pour la
 colle.

Le barbu et les
 pas de la colle et si
 le barbu est vu de
 une colle est en tout
 noir et au fond de la
 probable. pas de
 pas de la colle et au fond de la
 colle.

Cependant avec la
 microscope et les pas de la
 les barbus et les
 les barbus et les
 les barbus et les

figure bien et montre bien la
 représentation de la colle.

Le barbu n'est pas de la colle et
 fond de la colle. Voici un peu de la colle



Pernatula grisea.

La Colle de 19 Juillet 1862.

M.S. corallaire I p. 209.

foveolata et rep. anisul.



Le fœt. grisea.

mais c'est un

de plus de bien grisea que la grisea

figure dessinée à montrer la
disposition des spicules

Les spicules sont
arrangés en
chaque direction
sont les plus regardant
la poche. postérieurement
les lamelles latérales
à dos de calice

spicules de la
cub. gr.
spicul

les spicules ne sont pas isolés et forment des
faisceaux qui s'insèrent par le sommet.
Vole bas et pour comme une muraille
qui protège l'aplan de animalcule.



Tubus de chaque arête en arête
et tout moule de parties fines
spicules qui sont les plus
en ligne dans le tube

Les os de la face
des arêtes qui sont
par leur position
perpendiculaire
à l'axe de la
permathele
spicules sont
différentes
disposées que
sur la hauteur face.

sur la face antérieure - il y a
beaucoup de spicules latéraux, au
dessus; mais ce n'est pas tout.
Nombre d'ailleurs de la face latérale
pour il y a en ce cas plus ou
moins d'intervalles et
chaque d'arête.

La Celle le 40 juillet 1862

permatula grisea

notre je crois que
sur la partie côté et
sur la zone médiane
il y a une partie
supérieure, qui est
correspondante à la zone
la même la racine




De la même tige
une cavité occupée par
de membrane mince qui enserme
et recouvre la ligne du polypier

notre est fort difficile à décrire
mais il est facile à tout cela comme
il était naturellement déposé - ce dernier
est fort caractéristique

permatule ouverte pour
montrer la tige canaliculée
à travers laquelle qui se
trouve dans les parties de la
tige et dans la partie
communiquant directement
avec la cavité vitreuse ou
polypier. Car c'est la matière
bleue injectée par la
intérieur est sortie par
la bouche et se répand
sur le bras et l'entaille

La tige canaliculée et ici à
montré grande maille.

on lui a déjà
expliqué comment on
peut en tirer



Pernateta grisea.

Localité Rozpillet 1862

éléments. Bille

cellules de *Viminetum* d'immense
taille et rugueuses.



Voici le nematocyste qui ressemble bien
à ceux de certains alcyonnaires. Il n'est
pas petit et se compose d'un
cylindre.

Le cylindre est à sa base
différent, la cellule voisine lui est
il faut que le tube soit le
celui se séparant au milieu.

1/5



Pennatula Grisea -

La Caille le 20 juillet 1862,

on voit & que de la
pointe qui tremble
& fibre musculaire.

pennatule pèche et Vue de
profil.

Le thylacum polygynum parfaitement
noté la ligne polygynum
Coulée.

Le système à la polygynie tout
entièrement, ce thylacum, non
l'animal est l'entraîné



1
J'ai vu l'œuf la
pointe inférieure
et il me semblait que
le sang repoussait la bécasse
qui se trouve par
des musculaires et
entraînés.
J'ai vu enfin la

Pemmatula Granulata.

7
La Vallée de G. Gout 1862.




Vue par l'apex postérieur, celle qui
présente les granulations
les plus développées, et
les plus minces - elle
est en réalité due à la
même disposition que celle qui
est indiquée précédemment
on voit aussi la fin des antennes
couchées sur la bannière de
l'épithèle



In colle de 11 aout 1862

Permatula granulata



6:10 alléant ystus - au bord d'un calice
dehiscence, petit p. m. quel

concellule ou
tissu - en formant
spicules, et de plus en
quelque sorte par un.



2 *Pernatula grieca*

In cellule 20 juillet 1862

Les sexes ne paraissent séparés. Ce qui du moins
le peut offrirait fait garder une même
individu je n'ai point trouvé une seule
ovule male.


$\frac{1}{2}$



—œuf à huitième et neuvième de l'œuf.

Celui qui se trouve au centre de l'œuf est l'œuf.

$\frac{1}{2}$



—le plus fort de l'œuf est l'œuf qui se trouve au centre.
—le plus faible de l'œuf est l'œuf qui se trouve au centre.



—cellule de l'œuf qui se trouve au centre de l'œuf.
—le plus fort de l'œuf est l'œuf qui se trouve au centre.
—le plus faible de l'œuf est l'œuf qui se trouve au centre.

$\frac{1}{2}$



Voici un fait remarquable et curieux qui ne
fait jamais défaut. La cellule et la
tache germinative paraissent être développées
avant la vitelle.
Celle-ci le développement a lieu
au préalable. Si bien que si l'on a
l'œuf de la jeune cellule, on voit
qu'elle est déjà développée avant la vitelle.

De l'œuf qui se trouve au centre de l'œuf.
—le plus fort de l'œuf est l'œuf qui se trouve au centre.
—le plus faible de l'œuf est l'œuf qui se trouve au centre.

3 *Pematula grisea*.

La Calle le 20 juillet 1862.

8

L'appareil. on sevo semble se séparer bien
de la séparation.



$\frac{1}{2}$ Tubercule très petit et la plus part n'est il,
apparaît avant leur entrée moulante, au jour notable
à la cellule qui semble être une capsule. mais celle



différence semble être au développement ou
élément à cette position. formé, et
grand celle d'autre côté plus mince que
le développement et moulant

Il y a encore une bande au jour qui
semble simplement formée

L'élément très inférieur dans
me capsule comme tige, laquelle
est un peu plus comme cellulaire



Après l'analyse par la granulation.

La Celle le 20 juillet 1862.



1/2

Le testicule grisé et se creuse par la pression de la petite plaque
est contractile, ce à quoi le contourment
aussi est éparé et est de l'air et du le résultat
de cette contractilité.



celles spermatozoaires dont le plus mal organisé a déjà
regagné le germe.

celles spermatozoaires. 1/2 en sur germe

La Caille Le 6 Aout 1862

Pemphila Granulosa (Dv. J.-L. I n. 209)



Grande queue et org. distinct de
animaux qui ont été blanc mais
très beau

Les granules
ne sont qu'à peine
marquées, elles
ressemblent
croûtes en petites
lignes et que
la queue tend vers



Les barbelles sont
un peu plus molles
que dans le vivant, mais
après le la la pose la
forme, l'agencement. La taille
semble être un abstrait
semblable.



Spines qui forment un Calyx à 4 dents
ou dentures très saillantes, en ressemblant
longue à celle d'un insecte.

La disposition d'anneaux. de spicules est
entièrement différente de ce qui
existe dans le *Pemphila Grata*
Les anneaux semblent former deux rangées
en alternant. Il ne se dessinent ni l'un
ni l'autre. Comme dans la grata.

La coloration ici est due aux
spicules.

Les poils à l'inférieur de la tête
qui est piquetée mais très bonne
de spicules placés longitudinalement

Les antennes supérieures, enroulées de
bandelettes de spicules qui viennent se
rejoindre entre le Calyx de chaque anneau, de
cette façon, et correspondent l'un à peu
près au feu d'anneaux, plus le haut, plus.

La disposition d'un animal mort
dans le vivant, mais a fait semblance
de la queue.

6 La Colombe 11 août 1862.

Pernatula granulosa.

Les laves me paraissent aussi parfaites
qu'on dans cette espèce.



Tentacles me a été fort volumineux et en voie
de développement. La cavité enveloppant
cellulaire est considérable. Elle finit par
un rétrécissement au-dessus duquel se trouve
la capsule membraneuse que lui voit
très nettement l'éprouvette jusqu'à la partie
congruente de repli intestinal inférieure.

Il y avait deux autres de tentacles bien plus gros
en un mot de la taille habituelle.

Les tentacles m'ont paru former des poquets alvéolaires et d'autres
vers la limite des intestins.

Il y a peu de suite de différence entre les cavités polypaires
et celle de l'alignement X X.



La Calce à 6 pinnules.

Pennatula Granulata

Vue sous le face antérieure.

La position des pinnules est
nombreuse que les faces supé-
rieure présente une bandelette
blanchâtre.

L'accolation de cet animal avec la
disposition des anneaux est très
commune et facile. Je n'en ai jamais
vu ce dessin au très joli
dessin sur fond noir au crayon
bleu sur devant et à l'arrière
après que les anneaux sont de
couleur noir.



me attire vers de
champs. La couleur leur
attirent au jour le jour
de jour.

ces petits animaux ont eu de la peine
à se développer en cet
eau, et le hant.



Gemmatula granulata La Caille le 21 août 1862.



Barbule de Tentacul

partie cellulaire externe qui s'oppose évidemment
à la partie cellulaire

intérieure
par
granules et noyaux
par une membrane

qui donne dessein et dessein partiel
s'élève et s'élève
placé à l'intérieur

ici les tentacles
sont très nombreux
et se trouvent
à l'extrémité des
dessein de Gorgone.

les barbules sont
par 2, 3, 4 parties filiformes latérales

avec la direction et opposée aux
pendules

$\frac{1}{5}$ nouveau recue de
sachs = 2



$\frac{1}{5}$
gms 1 am

