

A.
S/

Pean species



anurella Bleigii

L3

anarella Pleizii

anarella Pleizii



V

anarela Bleizi. A. L. D.

anarela Bleizi.

✓

M⁸

(Supra Rustica
amour)

R. C. Rustica

amour

M¹² est une

amour

Trouve je une de mes de la Branchie

a chercher ici = Si elle est absolument
amour


ou si le Tetard ne le fait
pas absurde comme

M



M^{8.}

Rotcoff



Le canal devient
l'ouït au point
où l'on la
quiert la papille
abîmée à t.

Sorte de
langue qui
déclenche la
fuite au cœur
occupant le matin

$\frac{1}{2}$
auj. et
embryon

ouverte fente



Le point où le tube papilla devient taillant est juste à
deux doigts de l'extrémité ou le 5^e fibre musculaire rentrante
qui forme le tube
qui va vers la papille
qui va vers la papille

qui forme le tube
qui va vers la papille
qui va vers la papille



ancre qui
n'a pas
bilobie



Oscophragium qui
présente en arrière
une échancrure et
repoli median.



les bords
apparaissent
et glissent le
feu.

en bas sur une branche
trouvé dans la branche
grande → dans une appellation
et en bas.

M⁸.

Bostock le 8^{me} Juin 1874 -



La fig II appartient à un individu que j'ai
vu vivant et qui appartenait à qui
certainement n'a pas de tétard.
je le prépare et le cultive en faire
un hibou bien sûrement et voici
les observations qu'il a sur ce sujet
d'un officier Vincent Tanguy fut grêle
et le second espèce.

Mais l'ivernation était très
particulière que dans l'autre à la base de
chaque tétard se trouvait une huile blanche
j'aurais que j'ai cherché à rendre moins que
ne représente que de l'huile huile d'olive. et
non une protégation des tétards lui-même.

Les tétards étaient très très
épais et très marqués

je dois remarquer que j'ai trouvé qd Ceylilia
mâle ayant qd tétard externe qui n'a pas
une parure en Ceyl. ci et que j. crois Ceyl. ci comme chez
une race extrême de vertébré.

M¹² = M⁶.

Portef de 8' de Juillet. 1876.

Cette petite molgulide est très transparente et laisse透
透 la couleur. — elle n'a point ouvert ses oscules plus que
la moitié. — on voyait le tissu de tête plus opaque
que le reste et un peu luisant, avec le partie correspondant
aux deux des fentes blanches.

je la place dans une liqueur avec la conviction qu'elle
est différente de M⁹.

Cela à voir.

Préparation n° parue la suivante.

Les immobles aux angles sont recouverts d'un rouge brûlé
enfin de long pointe est une tache large jaune orangé.
Couverte aussi morte. Tuyau.
et les faces de chaque angle du fusil il y a aussi une petite
tache plus étroite et de même couleur.

Les fusils ont également aussi des faces particulières
les deux revêtements sur le rapprochement des deux faces
rentrées ou sorties, — c'est un raccommodement avec plusieurs
de sacrifices.

M¹² = M⁶ Cette formule me fait
grand plaisir — C'est ce que je veux faire
de similitude avec une certaine peine car — Léthaut clair
mais qui est difficile à faire bien au contraire l'acier chromique qui avec
l'acier prépare et au contraire tout temps — et les tissus
soit fragilité excellente — peuvent faire de moi le Guibey — et l'acier a caractère
particulier dont il faut faire attention — et l'acier a caractère
qui fait m'a quide. — Les tissus sont très
à corde et utilisés
à cette vane.



M⁸

Rostoff le 1^{er} de Juin 1873



Observation intéressante.

J'ai rencontré M⁸ à l'opéra l'opérateur étant
ordinairement lors quoique contracté -


l'opérateur a vu - ce futur fut pointue
et surtout l'absence des épinés de la tige
qui m'a permis de faire une truelle très
bien réussie.

Ici quelques observations que je fais

1^o Poche intestinale descend très bas près de la limite de la branche
L'organe genital descend très bas et est un peu
allongé & très étroit mais surtout latéralement à droite

= au milieu de la lumineuse et très grande que dans M².

2^o Poche respiratoire contractée par lequel il présente 6 cols



3^o Récemment le tremble fut très irrégulier que
dans la molgula M². Il est probable qu'il y a une branche
fusiforme ^{correspondant} au centre - de chaque partie irrégulière -

4^o Poche de l'ovule - est terminé pour une partie saillante et
telle que le terminal est l'ouverture d'un vase remarquable - voir le
dessin -

Rotcott le 1er Juillet 1878

(1)

M⁸:



Voici une molgule qui a été mise à abso-
lument à sec — Elle est très grande comparativement
à l'œuf — et a deux liphanes très grands.

L'œuf — au respirateur est beau, plus long — quand j'ai
plongé l'animal dans l'eau chlorique celui-ci ne fut pas
retracté.

Ce qui frappe — C'est la petite tête de jette, et liphanes
des parois du tube — ou dirait-on les espaces entre les parties des œufs.

Il avait parmi tous un tache jaunâtre avec le
cœur de Rojanus au dedans — Sur le cœur qui est
transpercé je n'ai pas vu de vésicules — Il est evident que celle-ci
comme M² sont adhérents pour la surface de la tunique. et pour
une très grande partie de sustentation. —

Les tubes sont tachés de plaques blanches D. qui sont
assez taillantes — . Surface un peu un peu normale et D^o C^o
rouge — La tunique est bleuâtre et rouge pour la tache
jaune verdâtre de M².

L'animal ici est un peu de côté gauche. Le liphanes postérieur
est de taille, le plus grand.

— Cette place est importante à signaler au sujet de la
condition biologique de l'embryon.

J'ai un autre individu pendant et j'ai vu que
ceux étaient toujours ce paquet et que par conséquent ils étaient
couverts d'une tache sur les deux parties postérieures et ce

M⁸


Sur la figure A. La Pyuthia Rustica qui le
trouva porter cette Molgule. Elle fut couverte de petits
globes transparents qui n'avaient pas été rejettés par
le Siphon et en M⁸ - et le chant d'un oiseau
détint exprès dans cette position pour nous montrer
que du côté du Siphon inséparable il n'y a aucun pas.

Remarque. Cette espèce ne me paraît pas être la Molgula
Macrotiphonica K., sur laquelle est absolument née.
J'aurai à évoquer g. plus brachiaire.

= Embryon est bien déjà formé sans queue dans
la coquille & chez -

et ne l'est point dans forme Allaboi de
ainsi que semble faire dire M. Heygger.

= Ovaire est externe pas rattaché au testicule
= Celui-ci est en ovoyer parfait et un canal
vient amener g. à l'oviducte.




Vu pour la face
intérieure à branche
écartée empêtrée et

L'ayant baptisé Le lugubre j'ai vu ressembler le Cass
steret mais non l'ovifère.


M⁵

La Manche ne me parait avoir que 3.

Mains
d'une partie




et grêle bumblebees
fort larges.



Les équateurs et parallèles

must be elevé et
taillés au dessus de la
partie intermédiaire. et
faire.




Circulaires.

(nota à voir je
crois que soit un
à que des répétis
mais à revoir)

6. meridien + 1 γ au max. fort peu élevé β de Raphi

l'anus - est presque vert à en de la bouche a peu au
peu au dessus



- a bord libre et souvent
perçant comme un
stranglement. Il peut faire
un bracelet labial. Circulaires



N^o 8.

Roscoff le 3 Juillet 1876.

La pente est assez grande.

Le théâtre est peu intéressant mais pas
trop mal construit et assez bien placé.
Dans la chambre principale j'ai
trouvé des papetiers considérables de
la même manière que dans les autres.

Maintenant je fais ce qui peut être fait pour l'isolation de
la coupole il n'y a que la verrière à faire
et le toit reste à refaire dans la coupe
de sorte que j'ai point obtenu de former
la coupole au-dessus. A moins trois fois
que je prenne pour couper la coupole transparente
— Je pourrais le faire que la verrière fut enlevée et
la partie de houssée dans la chambre principale.

Roscoff le 27 de Juillet 1875

M⁸ hier au mat' j'ai trouvé la Molgula &
sur une paquet de Syphonia venus de
Morgat —
J'ai acheté une autre Molgula le 1^{er} mai
ce n'est pas celle-ci

Je l'ai démontée à 1^o sans la défaire
complètement

1^o à la hanche bien infundibulaire
à une petite cavité au col
mésostème

à extréma malice large

2^o à droite qui donne sur la hanche
de l'infundibule
l'anterior d'ambiguus ne pas aillant
pas revêtu du muscle =

3^o et pour des besoins tout à l'opposé qu'il
qui était déclivous et sur la
dernière cavité. Cuvier M⁸

C'est donc deux ou trois

espèces que j'ai rencontré à Crozon, qui sont dans deux espèces de Roscoff.

Toutefois il y a une différence qu'il faut faire remarquer = de
la moitié. Mergou (a) est bien celle que j'ai anatomisée. Ce qui en rend
peut posséder des différences. Toute et il que la partie Mergou (a) est pour
le sphinx différent de tout cette qui est pris à public.

Avoir dans les espèces =

V. S.

· Je retrouve un second rebord
où les embryons furent amoncelés abondamment.
Voici deux des deux statives et cette dernière
en dehors de toute grêle application à
la lance et à la lame vive. — au golfe de
Guarmenez. C'est dans une application impossible
que l'anourisme. donné par Grod L'polittan.

= Seulement une de l'autre ne retenuable
pas à l'échelle de mon dessin à publier pour longueur
des tiges. mais bien pour leur diamètre qui
est très précis en C.B. Et le dessin.

Rapport sur Marquages à Astur le 25 d'août 1875

= 100 d'abord pour marquer pour Macrolipophis
= renverser l'orifice génital et la hiffure +
la branchie.

M⁶.

Le corps de Bojanus est relativement assez grand
et courbé en arc.

me

Diagonale

J'aurai dans un petit flacon. - une
Molécula avec quoi ?

Le branchie connue telles que l'assimile ne
permettent qu'en les diagonale par la
vive et pure Tulle pas la tenu que ne
du laitail pas venir de poignard à l'inspirat.
inspirateur. - La diagonale celle cepen d'au
M^r et au officiel.

J'ai trouve à orfèvre a papelle
filleante et des lour preuve
que ces embryons étaient morts.
je ne m'aurai point trouvée
Cela M^r.

Si telle aussi n'est pas du tout plus long
ni court.

Où l'importance et la nécessité de donner la
fixule intestinale descendais aussi assez bas.

M⁸
= Branchie


D'un bel échantillon Cutaneus d'ay
d'accide périgue

= J. replis mésidens

Le 2^e auteur huit ce droit fort petit.

= j'ai vu sur g plus grande S. Cordon de chaque côté
= les infundibules sont moins libres qu'au M².

= enfin — il n'y a pas de replis
autre à l'ay arrière jusqu'à



on peut faire au sein
y a 8. feutre autre
l'ay un infundibule etc
cette g. mésidens.

Goutteux —

me paraissent
beaucoup plus rares dans le cas
ramification que M² avec ce que il n'y a pas de
résemblance.

= la matière pigmentaire n'est pas limitée à g. band, et g. demin
ramification tout plus clairfondre.

M² et M⁴



Remarque

Dans la recherche q^{ue} M⁸ pour faire une préparation ouverte et décrire une race de brauchie, je me suis assuré certains de cette race - comme il papille Genève q^{ue}.

J'avais utilisé tout le reste M² par la brauchie. or they avendent. Il me semble que le caractère si net défini de la brauchie avec une dent infundibulum peut-être une race mais très légèrement差别 à l'autre. ne me paraît pas absolument rigoureux pour tout ce qui est modèles.

aussi ai-je q^{ue} Brauchie robes M² qui semblaient être à Meridien epais et double infundibulum et modèles qui peut-être n'étaient pas M².

Cela Voir.

Il faut aussi ne pas oublier que q^{ue} especes dont il a été question ailleurs et qui viennent avec le brin des Prehistoric, = il y aurait avoir par exemple quelques noms de ces races.

M^{me} de Sibylle.

je l'ai trouvée au milieu des Molgula socialeis
et observant que je la trouve peu à peu
la casaque ou Macrolipophenica.

- Je remarque les grandes espèces de raphides
postérieures qui brise le mélange
par une extrémité très pointue.
Les trois plus extrémités postérieures
de la merde.

par un voile purpura
net et fin.



Nous le faire



à droite comme le Yermin ou la capsule
présentant un angle. une humeur

Anuralla Bleizie



Thurella Blizzi



$\frac{1}{0}$

L'organe vibratile
est bien
petit et aux
recouvrements par
gauche -

C'est le tentacule

mediane
anterieur.

Il est
très mince
et presque
brisé
et absent.



M⁸ = amarella Reign



Bentacul
offrant rien de
remarquable et
de particulier par la
distinction d'espèce n*on*
indiquée -



Amurella Aleizii

ACADEMIE DES SCIENCES
ARCHIVES
INSTITUT DE FRANCE

