

b. Glandes intestinales.

m. app. absorbant. Tout est en fait formé par les mêmes cellules (épithéliales) pendant un certain temps en arrivant à l'intestin. et les mêmes cellules ont des caractères et des fonctions qui sont communs à toutes les glandes de l'intestin.

Différentes espèces. - et on les trouve dans presque tout le tube digestif et dans presque toutes les parties de l'intestin.

1^{re} Glandes de Lieberkühn.

elles ont deux qui sont plus simples et qui se ressemblent également dans les premières parties de l'intestin.

2^{de} Glandes, caractère de l'intestin de Brunner.

elles ont deux qui ont une structure particulière et qui se trouvent dans les premières parties de l'intestin.


3^{de} follicules Clost d'intestin.

1^{re} Glandes de Lieberkühn. - elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

Leur nombre est immense. - et les caractères et les fonctions qui sont communs à toutes les glandes de l'intestin.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.



2^{de} Glandes de Brunner. - elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

3^{de} follicules Clost. - ils ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

ils ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

Fei à vu des vaisseaux dans leur intérieur.

follicules noirs par ouverture.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

Plaque de Peyers.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.


elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

Plaque Gouffrès de la fièvre typhoïde.

Ce qu'on nomme Suc ou liquide intestinal.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.

elles ont une structure particulière et se trouvent dans les premières parties de l'intestin.



LABORATOIRE "ARAGO"
ARCHIVES
PROPRIÉTÉ
PUBLIQUE